COVID-19 Vacunas

para Personas Embarazadas y en Periodo de Lactancia

¿Deben vacunarse las Personas embarazadas o Recientemente embarazadas?

¡Sí! Estar embarazada o recientemente embarazada aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19. Esto significa una mayor probabilidad de ingresos en cuidados intensivos (UCI), ventilación mecánica para ayudar a respirar o muerte. Los embarazos afectados por la infección por COVID-19 tienen un mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Estar vacunado y mantenerse al día con todas las dosis recomendadas de las vacunas contra COVID-19 ayuda a prevenir enfermedades graves por COVID-19.

¿Son seguras las vacunas?

Las vacunas COVID-19 son seguras y las vacunas de Moderna y Pfizer se recomiendan para las personas embarazadas y lactando. Ahora tenemos pruebas de más de 100 estudios en todo el mundo de que los beneficios de la vacunación COVID superan el riesgo. No hay pruebas que sugieran que estas vacunas causen infertilidad, mortinatos o abortos espontáneos. El virus, sin embargo, puede causar todas estas cosas.

¿Cuáles son los efectos Secundarios de la Vacunación?

Las personas embarazadas o recientemente embarazadas pueden experimentan los mismos efectos secundarios que las no embarazadas. Por ejemplo, dolor en el lugar de la inyección, fatiga y fiebre. Puede tomarse paracetamol para la fiebre.

¿Puedo vacunarme si estoy en periodo de lactancia?

¡Sí! Los estudios han demostrado que las personas que han recibido vacunas de ARNm contra el COVID-19 tienen anticuerpos en la leche materna, lo que podría ayudar a proteger a su bebé.

Niños menores de seis meses de edad no son elegibles para ser vacunados, por lo que dando de lacatar es una manera de brindar cierta protección a su bebé hasta que pueda ser vacunado.

¿Cuándo debo vacunarme?

Lo antes posible! Las vacunas de COVID-19 pueden administrarse durante cualquier trimestre, aunque las nuevas pruebas sugieren que la vacunación en el tercer trimestre tiene más probabilidades de transmitir la protección al lactante. Además, las vacunas COVID-19 pueden administrarse al mismo tiempo que otras vacunas. Las vacunas COVID-19 se recomiendan a partir de los 6 meses de edad.

I-VAC
ILLINOIS VACCINATES AGAINST COVID-19
A project led by the Illinois Chapter of the American Academy of Pediatrics

Para más información
visite CDC.gov or ACOG Guidelines

Obtenga más información sobre I-VAC en illinoisvaccinates.com