

¿Necesita una Vacuna Contra el Sarampión?

Aquí hay un guía para ayudarle a
decidir según el año en que naciste.

Tenga en cuenta que las vacunas contra el sarampión en los Estados Unidos se llaman vacuna contra el sarampión, las paperas, la rubéola o la vacuna MMR. También se puede llamar la vacuna MMRV. Antes de 1971, solo se les llamaba la vacuna contra el sarampión.



Todos los adultos y niños mayores de 12 meses que viajen internacionalmente y todo el personal sanitario necesitan dos dosis documentadas, independientemente del año de nacimiento.

Antes de 1957

Es probable que no necesite una vacuna

- Es probable que tenga inmunidad (o protección) contra el sarampión. Consulte con su médico sobre los mejores pasos a seguir.

1957 a 1988

Es posible que necesite otra dosis de vacuna

- Debe tener la inmunidad adecuada después de recibir una dosis de la vacuna contra el sarampión cuando era niño.
- Si se vacunó entre 1963-1968 o está en alto riesgo, es posible que necesite una segunda dosis. Hable con su médico sobre los mejores pasos a seguir.

1989 o posterior

Es probable que no necesites otra dosis de vacuna

- Cualquier persona nacida después de 1988 debería haber recibido rutinariamente dos dosis. Dos dosis de la vacuna contra el sarampión (MMR o MMRV) son altamente efectivas y generalmente protegen a las personas de por vida contra el sarampión.
- Los niños deben vacunarse contra el sarampión a los 12-15 meses de edad y a los 4-6 años de edad.
- En entornos de transmisión comunitaria de sarampión o brotes, se puede dar una segunda dosis antes.



**Habla con tu
médico para ver si
estás protegido.**



Fuentes: Jetelina, K. (2025, 17 de marzo). 10 preguntas frecuentes sobre MMR y protección contra el sarampión. Your Local Epidemiologist. y CDC (2025, January 17). Vacunación contra el sarampión <https://www.cdc.gov/measles/vaccines/index.html>